

# Periodos de retiro previo al sacrificio para el antiinfeccioso en ganado de engorda

MARCA	PERIODO DE RETIRO ANTES DEL SACRIFICIO
A180® ( <i>mesilato de danofloxacin</i> )	4 días
DRAXXIN® ( <i>tulatromicina</i> ) solución inyectable	18 días
EXCEDE® ( <i>ácido libre cristalino de ceftiofur</i> ) suspensión estéril	13 días
EXCENEL® RTU ( <i>clorhidrato de ceftiofur</i> ) suspensión estéril	3 días
LA-200® ( <i>oxitetraciclina</i> ) inyectable	28 días
NAXCEL® ( <i>ceftiofur sódico</i> ) polvo estéril	4 días
Baytril® ( <i>enrofloxacin</i> )	28 días
Bio-Mycin® inyección antibiótica de oxitetraciclina	28 días
Micotil® ( <i>tilmicosin</i> ) inyección	28 días
Nuflo® ( <i>florfenicol</i> )	28 días
Penicilina	10 días
Tetradure™ ( <i>oxytetraciclina</i> ) inyección	28 días

A180 y DRAXXIN son marcas registradas de Pfizer Inc. EXCEDE, EXCENEL y NAXCEL son marcas registradas de Pharmacia and Upjohn Company, una división de Pfizer Inc. LA-200 es la marca registrada de solución inyectable de oxitetraciclina de Pfizer Inc. Baytril es marca registrada de Bayer Corporation. Bio-Mycin es marca registrada de Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. Micotil es marca registrada de Eli Lilly & Company. Nuflo es marca registrada de Schering-Plough Veterinary Corp. Tetradure es marca registrada de Merial Limited. ©2006 Pfizer Inc. Todos los derechos reservados.